



Gebrauchsanweisung

Bitte aufmerksam lesen.

PARI ProtECT®

Lutschpastillen

Lesen Sie sich diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung von PARI ProtECT Lutschpastillen beginnen. WERFEN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG NICHT WEG! Sie enthält wichtige Informationen. Wenn Sie Fragen zu PARI ProtECT Lutschpastillen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, Apotheker oder den Vertreter.

Was sind PARI ProtECT Lutschpastillen und wofür werden sie angewendet?

PARI ProtECT Lutschpastillen sind ein Medizinprodukt, das Ectoin®, ein natürliches, zellschützendes Molekül mit entzündungsreduzierenden und membranstabilisierenden Eigenschaften enthält. PARI ProtECT Lutschpastillen sind Lutschpastillen zur Behandlung und Prävention üblicher Erkältungssymptome, trockenem Mund und Rachen sowie Heiserkeit durch Überanstrengung der Stimme.

Die Lutschpastillen verringern Entzündungen der Schleimhäute in Mund und Rachen und lindern Halsschmerzen, Schluckbeschwerden und Heiserkeit. Sie stabilisieren die Zellmembran der Mundschleimhäute und verringern dadurch die Gefahr einer bakteriellen oder viralen Infektion im Mund- und Rachenbereich.

PARI ProtECT Lutschpastillen bilden einen Schutzfilm in Mund und Rachen, den sogenannten „Ectoin® Hydro Complex“, ohne ein schleimiges Gefühl zu hinterlassen. Reizungen wie Stimmmüdigkeit, Kratzen im Hals, Mundtrockenheit durch übermäßigen Stimmgebrauch, Allergene, trockene Heizungsluft, kalte Luft, Klimaanlage oder Rauch, können vorgebeugt und gemildert werden. Außerdem lindern PARI ProtECT Lutschpastillen den Hustenreiz und unterstützen die freie Atmung. PARI ProtECT Lutschpastillen fördern die Schleimbildung, befeuchten trockene und gereizte Schleimhäute und unterstützen deren Regeneration. Die Lutschpastillen haben einen milden, angenehmen Waldfrucht- und Mentholgeschmack und sind frei von Konservierungsstoffen und Zucker. Die Wirkung von PARI ProtECT Lutschpastillen basiert auf 100 % natürlichen Inhaltsstoffen.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- PARI ProtECT Lutschpastillen sollten nicht während andauernder Traumata, z. B. nach Operationen oder Verletzungen im Mund angewendet werden.
- PARI ProtECT Lutschpastillen sollten nicht angewendet werden bei Überempfindlichkeit gegenüber Ectoin® oder einem anderen Inhaltsstoff der Lutschpastillen.
- Im Falle allergischer Reaktionen müssen PARI ProtECT Lutschpastillen unverzüglich abgesetzt werden.
- Kinder unter 6 Jahren sollten PARI ProtECT Lutschpastillen nicht verwenden, da Erstickungsgefahr besteht.
- Wenden Sie die Lutschpastillen nicht im Liegen, wie z. B. im Bett an, da Erstickungsgefahr besteht.
- Wenden Sie keine Lutschpastillen aus beschädigten oder eingestochenen Blisterpackungen an.

PARI ProtECT Lutschpastillen außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Was muss ich vor der Verwendung von PARI ProtECT Lutschpastillen wissen?

Es liegen keine Informationen zu Wechselwirkungen zwischen PARI ProtECT Lutschpastillen und anderen Lutschpastillen vor. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, bevor Sie andere Medizinprodukte oder Medikamente anwenden.

Wie wende ich PARI ProtECT Lutschpastillen an?

Lassen Sie alle 3 Stunden oder nach Bedarf 1 bis 2 Lutschpastillen langsam im Mund zergehen.

Mögliche Nebenwirkungen von PARI ProtECT Lutschpastillen

PARI ProtECT Lutschpastillen sind gut verträglich. Bisher sind keine wiederholt auftretenden oder anhaltenden Nebenwirkungen bekannt. Bei übermäßigem Verzehr kann in seltenen Fällen aufgrund der Inhaltsstoffe Sorbitol und Maltitol eine leicht abführende Wirkung auftreten.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. den Verteiler des Produktes, wenn Sie Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Verwendung von PARI ProtECT Lutschpastillen feststellen.

Sollten die Symptome anhalten oder schlimmer werden, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Wie bewahre ich PARI ProtECT Lutschpastillen auf?

PARI ProtECT Lutschpastillen sollten zwischen 2 °C und 25 °C an einem trockenen Ort gelagert werden. Das Verfalldatum von PARI ProtECT Lutschpastillen ist auf der Umverpackung und auf der Blisterverpackung aufgedruckt. Verwenden Sie PARI ProtECT Lutschpastillen nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr.

Zusätzliche Informationen

Zur Verwendung von PARI ProtECT Lutschpastillen während der Schwangerschaft und Stillzeit liegen derzeit keine Daten vor. Wenden Sie sich bitte vor der Verwendung dieses Medizinproduktes an Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie:

- schwanger sind oder stillen
- unsicher sind, ob Sie schwanger sind oder nicht.

Inhalt von PARI ProtECT Lutschpastillen und weitere Informationen

Z. B.:

- 2 Blisterverpackungen mit 10 Lutschpastillen
- 1 Blisterverpackung mit 2 Lutschpastillen

Inhaltsstoffe

Ectoin®, Waldfruchtgeschmack, Menthol, Traubenschalenextrakt, Zitronensäure, Acesulfam-K, Gummiarabikum, Maltitol, Sorbitol, Wasser, pflanzliches Öl und Bienenwachs (Trennmittel).
1 Lutschpastille (1 g) enthält 100 mg Sorbitol und 422 mg Maltitol (Süßungsmittel).
1 Lutschpastille (1 g) = 0,044 BE.

Hersteller

 bitop AG
Stockumer
Str. 28
58453 Witten
Deutschland

Vertreiber

PARI GmbH
Spezialisten für effektive
Inhalation
Moosstraße 3
82319 Starnberg
Deutschland
Tel.: +49 (0) 8151 279 279

Stand der Information: 2019-05

Erklärung der auf dem Produkt verwendeten Symbole:

 CE-Kennzeichnung	 Hersteller	 Bitte Gebrauchsanweisung beachten	 Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden	 REF Bestellnummer
 Chargennummer	 Verwendbar bis (Verfalldatum)	 ^{25°C} Temperaturbeschränkung	 Trocken lagern	